

Sur une espèce Singulière d'Epilepsie,
avec des Reflexions Sur l'utilité des cauterés
dans la cure de cette maladie.

L'Epilepsie est une maladie malheureusement très commune et dont on ne connoît pas encore tous les accidens ni tous les phénomènes. Une observation faite avec exactitude, fait la base de ce mémoire ; elle offre des particularités que je n'ai vues de près nulle part ; si quelques unes ont été entrevues par quelques observateurs, on n'y a pas fait toute l'attention qu'elles méritoient, et il paroit qu'on a trop négligé les vues pratiques qu'elles devroient suggérer. Je souhaite bien sincèrement que l'Académie Royale de Chirurgie, cette compagnie si savante et si éclairée, trouve mes observations et les réflexions que j'ai eu de voir y joindre, dignes de l'hommage que je lui en fais.

Le 1^{er} juin 1775, la femme du Sr. Serron, du Village de Rochefort, en franchise comté, fit trois lieues avec des Souliers trop étroits, et les deux gros orteils se gonflèrent et devinrent très douloureux. Bientôt il se forma sous les ongles de ces orteils deux ulcères anciens qui fournissoient abondamment. Les bords de ces ulcères étoient enroulés, bleuâtres, livides ; le fond en étoit blafard et rempli de petites excroissances qui bourgeoient très-



rapidement et se détruisaient presque de même et qui
fournissoient souvent du sang. Tout le tour de l'ongle
étoit enflammé et douloureux.

Cette femme appliqua pendant cinq à six mois sur
ces ulcères un grand nombre de topiques qui firent d'avis
succès. Pendant cet intervalle l'ulcération s'étendoit jusqu'à
la racine de l'ongle, qu'on étoit obligé de détruire pour
découvrir toute la profondeur du mal.

Dans le mois de décembre le pouce et l'index de chaque
main s'enflèrent et sous peu de jours ils furent
ulcérés de même que lesorteils. Tous les autres doigts
tant des pieds que des mains furent successivement atteints,
et ceux qui le furent le moins étoient gonflés, et il s'en étoit
de dessous l'ongle un peu d'un ligameur rouge et serré,
d'avis qu'on put y voir une ulcération bien décidée.

Dans l'été de 1774, les choses étoient toujours dans le même
état, la malade fit usage pendant quelque temps, et d'après
les conseils de M. Atthalin, célèbre professeur en médecine dans
l'université de Besançon, du lait, des sucs d'herbes
antiscorbutiques, et des pilules de ciqes. Les remèdes sembloient
avoir mis les ulcères en meilleur état, ils étoient moins
enflammés et moins douloureux, l'évolution sembloit se
rapprocher de l'état purulent. La malade voyant qu'elle
qu'on ne faisoit pas de progrès selon ses desirs, se livra de
nouveau aux médicaments, dont un conduisit enfin les
ulcères à une cicatrisation lâche et de mauvaise qualité.

Le principal remède qu'il y employât fut une pommade
qui nous parut faite avec de l'ardaise en poudre mêlée
avec de la graisse. Je vis la malade à son retour de
chez le guérisseur, vers la fin de juillet, environ quatre
mois après l'ouverture des premiers ulcères. ils étoient
déchirés et plusieurs étoient cicatrisés; d'autres fourmilloient
encore un suintement serreu, et l'entour de l'ongle,
de tous les doigts indistinctement, étoit encore enflammé
et sensible. Cependant la malade continuoit la
pommade du medecin et les ulcères guérissent et se
déchirer de plus en plus. Lorsque cette femme étoit
à la plus belle espérance de se voir bientôt quitte de
son mal elle fut renversée par un accès d'épilepsie, qui
ne fut pas long et la vint, mais qui revint environ cinq
à six fois par mois, sans aucune régularité dans le retour.

Cette femme, son mari et ses enfans eurent grand
soin de secher ce malheur. En 1776, dans la nuit de novembre,
elle eut la langue coupée par accident dans un accès de
plus fort. (a) Cette blessure occasionna des accidents et l'on
fut obligé de demander du secours.

Depuis l'époque de la première attaque de cette maladie,
après la déhiscence des ulcères, jusqu'à celle où la langue a
été coupée, cette épilepsie a eu constamment plusieurs
accès par mois, quelque fois même plusieurs dans la même
semaine, surtout dans les derniers temps. Cependant les
deux premiers ulcères s'étoient ouverts sur deux gros ostéites

(a) Cette plaie de la langue,
qui étoit considérable, fut
réunie sans aucun appareil;
j'en envoie le détail en
1777, à l'Académie Royale
de chirurgie.



se suppurait après abondamment, mais point après pour suspendre les crises. Je conseillai à cette malade de se faire établir deux cautères, et de prendre quelques remèdes pour détruire, s'il étoit possible, la cause d'un mal aussi fâcheux; elle ne suivit aucun des mes avis, et dès que la plaie de la langue fut entièrement cicatrisée je cessai de la voir.

Au printemps de 1777, elle eut un accès qui la renversa sur un pot de bouillon qui enfla près du feu, elle devint morte incendiée s'il ne s'en fut trouvé personne pour la secourir; elle en fut quitte pour une très large brûlure faite par le bouillon, (le pot s'étant brisé sous elle) qui comprit depuis la nuque jusqu'au milieu du dos. L'épaulle droite fut brûlée jusqu'aux muscles; il s'y forma une escarre très épaisse. Dès le jour de cet accident la malade n'a pas eu la moindre attaque d'épilepsie. La brûlure fut si profonde que les bords, qui étoient plus superficiels ont été plus de trois mois acquis. La suppuration étoit fort abondante et la femme se portait bien d'ailleurs. D'après mes avis on ne s'en point refuser l'ulcère profond qu'elle avoit sur l'épaulle, on fit un cautère, dont l'écoulement étoit considérable. Au bout d'un an, la malade ne sentant plus aussi vivement le grip de la boue et autre dont elle jouissoit, on pourroit laisser fermer l'ulcère; huit jours n'étoient pas écoulés encore depuis qu'il ne fournissoit plus rien, qu'elle eut un accès foudroyant d'épilepsie, dans lequel on crut qu'elle periroit; elle en demeura maniaque, faisant les plus grandes

extravagances et désespérant tous ceux qui l'environ-
noient. Croirait-on que la proposition que je fis alors de
rétablir le cauthère, soit à l'épaule soit ailleurs fut rejetée, et
que l'infirme malade se vidant avec opiniâtreté,
préféra sa triste situation à la bonne santé qu'elle
devoit espérer en portant le cauthère?

Après avoir passé quelques mois dans cet état, les
ulcères des pieds, qui étoient détrempés pendant que la
brûlure s'éteignoit, se rouvrirent et la folie ceda peu à peu,
mais les accès d'épilepsie continuèrent à revenir très souvent.
Enfin elle est morte en 1780, sans que j'aie su de quelle
maladie.

Cette femme a eu un enfant étant épileptique, mais
la grossesse n'a paru avoir aucune influence sur la
marche ordinaire de la maladie.

On s'est depuis longtemps vu d'un épileptique
dans l'air, ou d'un consubstantiel quelconque, fait sur
certaines personnes une impression si forte, qu'elles sont elles-
mêmes saisies de convulsions; on en trouve dans les observateurs
une foule d'exemples; ~~mais~~ je crois qu'il seroit superflu d'en
citer aucun. Mais on ne s'étoit pas même douté que
cette maladie put être contagieuse d'une autre manière.
Notre observation n'en établit pas la certitude, mais elle
en fait soupçonner la possibilité, et elle nous semble
devoir inspirer aux observateurs une louable circonspection à
prononcer, jusqu'à ce que des faits après nombreux aient
éclairci ce point pathologique.



Le mari de la Serron fut le premier sur lequel cette maladie sembla s'étendre; il avait toujours partagé son lit avec sa femme; il devint Epileptique en 1776, les accès étoient longs, il étoit arrêté de leur approche par un fourmillement au bout de la langue. Cet homme en Sanguin et d'une forte constitution. Le sang dans les temps de l'accès se portoit à la tête avec précipitation et donnoit lieu de craindre qu'il ne laissât des stases dans le cerveau qui auroient pu déranger les fonctions de cet important viscère.

Plusieurs saignées furent faites, dans l'intention de diminuer la pléthore, et ensuite il fut mis à l'usage du petit lait avec la crème de tartre, des bains de la rivière pendant une grande partie de l'été; il observoit un régime délayant et rafraichissant. Ces ^{seuvers} améliorèrent son état, mais les accès, quoiqu'un peu moins forts revenaient toujours. La valeriane sauvage en poudre à laquelle je faisois ajouter une huitième partie de Rhubarbe et autant d'Étipe martial de l'éméri, continuée pendant longtemps, mit fin aux accès, dont il n'a eu aucune rechûte. Depuis le moment de la première attaque cet homme n'habita plus avec sa femme; il a eu des accès pendant près de quinze mois.

Lorsque la Serron se vit éloignée d'elit de son mari elle se chagrina, les accès devinrent plus fréquents et plus forts, elle eut des moments de violence et de fureur; enfin elle se radoucit et se donna tout à la société qu'elle avoit perdue, en faisant coucher successivement avec elle deux de ses enfans et une de ses nièces. Tous devinrent epileptiques;

Un petit garçon de six ans n'y coucha pas trois semaines,
une fille de huit à neuf ans y coucha près de deux mois, et
la nièce âgée d'environ quatorze ans fut plusieurs mois
~~avant de~~ ^{rien éprouver}. Quelques purgatifs, indiqués par les signes
de l'abuse de l'estomac et des intestins et par la mauvaise
digestion chez ces enfants, joints à quelques toniques,
et leur séparation d'avec la malade, les guérissent en
peu de temps, à l'exception du petit garçon, qui a eu
des accès environ tous les quinze jours pendant près
d'un an. Je n'ai pas vu dire que ces enfants aient
eu depuis eus aucune récidive de cette maladie.
J'ai vu la nièce l'année dernière, elle est grande fille
et joint d'une parfaite santé.

Est-il présumable que l'homme robuste et les trois enfants
dont nous venons de parler, devenus épileptiques
par la seule impression que la présence de cette femme,
dans l'accès, avait faite sur leur imagination? Depuis
longtemps ils étaient, les uns et les autres accoutumés
à la vue de ce spectacle, et la terreur devoit être
plus forte et les affecter plus vivement dans les commen-
cements qu'après plusieurs années. On penseroit peut-être
que ces personnes couchant avec la malade, la voyaient
de plus près, et dans des circonstances qui pourroient ajouter
à l'horreur d'un tel spectacle. à cela je réponds que cette
femme étoit après rarement surprise de l'accès pendant
la nuit, mais presque toujours pendant la journée, lorsqu'elle
étoit occupée.



(b) Pentecost. 2, observ. 39.

(c) Ephém. germ. dec. 1,
an. 2, observ. 9. On
trouve dans cette collection,
dec. 1 et 2, an. 9 et 10, obs. remèdes.

14, 61, 166, des histoires
d'épileptiques, qu'on a guéris
par la simple application
d'un repicatoire, comme on
voit en quelques
remèdes, ailleurs. etc.

Ce n'est pas ici la première fois qu'on a vu un ulcère
ou un cautère guérir l'épilepsie; plusieurs fois des brûlures
accidentelles, semblables à celle de notre malade ont remédié
à ce terrible mal après qu'il avoit résisté à tous les autres.
Dom. Pauvarole, (b) rapporte qu'un homme épileptique
étant tombé dans le feu et se étant brûlé au pied, n'avoit eu
dans la suite aucune attaque de cette maladie. Segerius, dit
avoir vu un jeune homme, épileptique dès l'enfance, qu'un
semblable accident avoit guéri (c).

(d) Voy. les observ. de cet
auteur, C. 5, pag. 45, et
la biblioth. de Med. de
Glaucques, in 12 t. XI p. 208.

il en a rapporté quelques
quelques cautérisations, dans
l'endroit designé par Meekren, très concluante en faveur des cautères, dans le traitement de
l'épilepsie.
rien par toujours sans danger,
d'autant plus qu'on y laisse le
feu après longtemps pour porter
son action sur les, qui
communiquent bientôt l'ulcère
jusqu'aux parties contiguës
dans le crâne, et occasionne
une inflammation mortelle.
Voyez les observ. de M. M. de la
au point de vue à ces sujets.

Meekren rapporte qu'un jeune homme épileptique, qui avoit
d'horribles accès, fut guéri par l'application d'un cautère actuel
sur la racine de la suture sagittale avec la coronale. On
extraînt la suppuration au moyen d'un pois qu'on mettoit
dans l'ulcère, et le malade fut guéri sans retour. (d)
M. Ruffet, célèbre chirurgien de Paris, a présenté à
l'Académie Royale de chirurgie, en 1755, deux observations
très concluantes en faveur des cautères, dans le traitement de
l'épilepsie.

Une demoiselle de dix huit ans, eut une attaque d'épilepsie;
les saignées, les purgatifs, les bains, les eaux de balnearie ne purent
empêcher une seconde attaque, un mois après la première,
et la malade en eut de mois en mois pendant plus de deux
ans, malgré tous les remèdes qu'on mit en usage. M. Ruffet
proposa un cautère au bras; la première accès en fut reculé
de quatre mois et fut beaucoup moins violent. On fit un
second cautère à l'autre bras, et la malade ne fut plus
mois sans le moindre ressentiment de son mal. Surpense

9

encore par un nouvel accès plus léger que les autres, on pratiqua à
cejaambe un troisième cautère, et depuis ce temps il n'y a plus
eu d'accès.

Si l'utilité des cautères multipliés est prouvée par cette
observation, M. Ruffel en rapporte une seconde, qui, en
prouvant le même fait, montre avec autant d'évidence
le danger qu'il y a de les supprimer, quand une fois ils
sont établis.

Un homme de 60 ans eut une violente attaque
d'épilepsie, qui fut suivie d'une autre quinze jours après,
malgré les remèdes dont il fit usage dans cet intervalle.
L'application d'un cautère retarda le troisième accès et
en diminua les symptômes. L'établissement d'un second
cautère ~~des~~ ^{sur} toutes les inquiétudes sur la récidive. Au bout
de huit mois, le malade s'occupant quasi, laissa refermer
un de ses cautères; cette imprudence fut marquée par
le retour de l'épilepsie. Dès le lendemain l'épout fut
rétabli, et le malade a vécu dix sept ans sans aucune
rechute. (e)

(e) Médecine de France,
tome 1755. pag. 171, et le
Bibl. de la Faculté. tome
17. in 12 pag. 481.

(f) Ripot, traité de
l'épilepsie. pag. 589.

Willis, parle d'une femme épileptique qui n'avoit
point d'accès aussi fréquents que son cautère fluoit,
et qui les reprenoit aussi tôt qu'il se détachoit. (f)

On lit dans le Supplément de la chirurgie d'Heister,
recueilli par M. Gault, une notice très courte d'un mémoire
lu à l'Académie Royale de Chirurgie, par feu M. Dordenave
dans lequel il prouve l'utilité des cautères pour la guérison



de l'épilepsie, et détermina les cas où il conviendrait de pratiquer un épuré pour l'expulsion de l'humeur morbifique. Une connaissance plus étendue du travail de M. Bordenave m'aurait peut-être décidé à supprimer toutes mes réflexions; mais comme elles sont émanées de l'observation attentive du fait qui fait la base de ces mémoires, je les remplirai, du moins ne répéter qu'une partie de ce que M. Bordenave a déjà avancé.

On a vu que les grandes révolutions, les maladies aiguës qui mettent la vie en danger, le changement de climat, guérissent quelquefois l'épilepsie, soit en imprimant aux nerfs des secousses capables de changer leur aptitude à renouveler les mouvements violents et irréguliers qui caractérisent cette maladie, soit en changeant la disposition des parties constituantes de l'individu. C'est de ces guérisons peu attendues, produites en apparence par des chocs violents que quelques praticiens ont voulu que par des moyens très actifs et très-quipants, capables d'atteindre la base de la constitution, ils pourroient obtenir le même avantage. On a conseillé les préparations chimiques les plus actives, celles du cuivre, du mercure, de l'antimoine; l'injection de substances médicamenteuses dans les veines, le fragement, les grandes opérations de chirurgie, telles que le trepan, la castration, les brûlures de.

Il s'en faut beaucoup que les remèdes violents réussissent toujours, il arrive très-souvent qu'ils occasionnent des accidens graves et augmentent la maladie qu'on a

devenir acquies par eux. Les moyens chirurgicaux ne
sont pas non plus indifférents par eux même, ils peuvent
être mortels. Les avantages qu'ils procurent ne sont

(9) les anciens les regardoient

cependant comme la dernière point au dessus de ceux des caustères; et ce n'est en effet
renouveler contre cette maladie;
et ils la regardoient incurable que par la suppuration qui résulte de la division des
quand les caustères avoient été portés, que ces opérations ont eu quelques succès. Mais
inutiles. ils en appliquoient qu'on s'en étoit proposé. Mais les cautères, et les caustères
dans la poitrine et un troisième
en vis à vis de l'articulation ne sont pas indiqués dans tous les cas d'épilepsie (9)

de la première vertèbre avec un maçon, âgé de 50 ans, du village de Briesau près de Dole,
la tête. V. Celse, l. 8. c. XXIII.

est en 1778, une attaque d'épilepsie, suivie de plusieurs autres, à
quelques jours d'intervalle. Cet homme attribuoit ce mal à une
suppression de transpiration, causée par un grand froid qu'il avoit
souffert dans une carrière, au milieu de l'hiver. Après quelques
années il lui restoit une douleur sourde, mais forte, qui occupoit
toute la partie postérieure de la tête. Les remèdes généraux, les
diaphorétiques, les toniques, la valériane, n'apportèrent à son mal
qu'un médiocre soulagement, en éloignant un peu les accès.
Je lui proposai un très large vésicatoire, qui fut appliqué à la
nuque et entre les épaules; la suppuration en étoit très abondante
lorsqu'il survint un accès dans lequel le malade périt.



(12) à sept lieues de
Sarrebrun où j'eus, en
octobre 1789.

il existe à Witte, dans la Lorraine allemande, (12) une
fille d'un brigadier de maréchaussée, qui après un mariage
causé par un amour malheureux est devenue
épileptique. il y a plus d'un an qu'elle en tombe au feu;
elle a eu le visage brûlé presque jusqu'aux os, la vue en
a été perdue; la poitrine et le bas ventre en ont été

également maltraités, de sorte que presque toute la surface antérieure du corps ne forme qu'un ulcère. Une suppuration exaspérée ou de toute part, sans quelle violence ni la fréquence des accès en aient eu rien diminués. Cette fille est un objet d'horreur pour tous ceux qui ont la curiosité de la voir.

Outre ces grandes revolutions dans le corps, les brulures, les opérations de chirurgie, ont des dangers par elles mêmes,

(L) Celse dit que quelques-elles peuvent devenir funestes relativement, et rendre l'épilepsie incurable, s'il s'en trouve guéries pour avoir été la mortelle, en portant le trouble et le désordre dans toute la sang chaud d'un gladiateur. machine.

L. 3, c. XXXII.

Culpe, en rapporte un exemple mémorable: un jeune homme que le désespoir de son mal décida à boire du sang humain pour se guérir, (L) le prit d'une main tremblante, le bût avec ^{une} horreur et une violence inexprimable; le mal en augmenta et dans un accès de plus fort, il tomba au feu, se brula la jambe, qui s'engangea bien tôt et qu'on fut obligé d'amputer. Un accès terrible le tua le lendemain.

(K) Tissot, trait de l'épilepsie de l'opération. (K)

pag. 768.

Toutes les observations rapportées ci-dessus nous paraissent circonspectes pour qu'on puisse en déduire des conséquences également concluantes, pour ou contre l'usage des caustiques, dans le traitement de l'épilepsie; mais en nous bornant à ce que quelques uns de ces faits offrent de plus évidents nous croyons pouvoir conclure qu'ils seront avantageux toutes les fois qu'il y a suppression d'un ou de plusieurs ulcères habituels paraît en être la cause. Il ne suffit pas de rétablir l'écoulement des ulcères, il faut que la suppuration soit

beaucoup plus abondante qu'elle n'étoit auparavant; cette
regle émane de l'observation de la femme Serrou, chez
laquelle le rétablissement de deux ulcères, qui suppureroient
beaucoup ne fut pas suffisant pour suspendre les accès.

ils seroient avantageux toutes les fois qu'une humeur
ambulante, se portera tantôt ici, tantôt là, et semblera
influor sur la gravité ou sur le retour des accès. Toutes
les fois que l'épilepsie semblera avoir été suivie avec une
autre maladie, comme dans l'observation lue à l'Académie
Royale de Chirurgie, par en 1778, par M. Pipelet l'aîné.
Une jeune fille de 15 ans, qui jouissoit à tous égards d'une
santé parfaite gagna la petite verole, pour avoir séjourné
dans la chambre d'une demoiselle épileptique, qui avoit eue
cette maladie. Des attaques convulsives furent très fréquentes
et très vives jusqu'au tues de la suppuration de la petite verole,
elles cessèrent pendant l'adulces, et revinrent avec un caractère
épileptique après l'excitation. Un exutoire à la jambe, et
les remèdes convenables à la cure de l'épilepsie rendirent

bien tôt peu à peu les accès moins vifs et moins fréquents,
et au bout d'un mois il n'en fut plus question. (L)

Cette observation de M. Pipelet ajoute aux soupçons que
l'épilepsie peut quelques fois être contagieuse, soupçons qui nous
semblent fondés, d'après les quatre observations que nous avons rapportées
plus haut.

il est avéré que dans beaucoup de cas les exutoires, s'ils
n'interceptent pas entièrement les accès d'épilepsie, ils les
éloignent du moins considérablement et les affoiblissent. C'est

(L) Scam, de l'Acad. Royale
de Chirurgie. au. 1778.
par M. Louis.



donc une repousse déjà très grande que d'avoir un moyen
d'éloigner les aires, et il est possible que dans les intervalles les
nerfs reprennent de leur intégrité et perdent enfin leur
malheureuse aptitude. M. de Warr-winton a dit à ce sujet,
que comme les traces des idées qui ne sont point rappelées de-
tenuent s'effacent entièrement, de même si les
mouvements épileptiques servent à la disposition à les renouvelles
et détruit. Mais tous les cas où l'on pourroit attendre cet
effet du caustère ne sont pas connus encore. L'observation
seul peut apprendre à en faire le discernement; il n'y a qu'une
société littéraire spécialement occupée des progrès de l'art
de guérir qui puisse rassembler des faits en assez grand nombre,
pour que de leur réunion il résulte des règles qui appaisent
toutes les difficultés. heureux si la mémoire peut contribuer
à augmenter le dépôt de ces faits, et si l'académie le juge
digne de marcher à la suite de ceux des M. M. Andouille,
Ruffel, Dordenave, Pipelet &c. &c.

Thomassin, correspondant de l'académie, et de
celles des Sciences, belles lettres et arts de Besançon, et
de Dijon, chirurgien major du 1^{er} Régiment de
Chasseurs à cheval.

De Sarreguemines le 19 8^{bre} 1789.